

PROCEDURE BIJ ACUTE DIARREE


LEGENDE

- *Acute diarree* is een plotseling optredende afwijking van het gebruikelijke defecatiepatroon die korter dan veertien dagen bestaat; de frequentie en de hoeveelheid van de ontlasting zijn toegenomen en de ontlasting bevat meer water dan gewoonlijk.
- Diarree moet duidelijk onderscheiden worden van overloopdiarree, waarbij de vloeibare substanties voorbij de faecalomen passeren. Het belang van een rectaal toucher (uitgevoerd door de verpleegkundige) dient hier zeker benadrukt te worden.
- Epidemisch: een snelle verspreiding van een ziekte onder de bevolking zodat meerdere mensen tegelijk ziek worden. Indien >2 bewoners op dezelfde afdeling tegelijk diarree ontwikkelen moet de cra zeker de volgende ochtend verwittigd worden.
- Syst bd <100 of >160: de systolische bloeddruk is lager dan 100 of hoger dan 160 mm hg
- $T^{\circ} > 37,5$: temperatuur hoger dan $37,5^{\circ}\text{C}$; in de lies gemeten.
- Belang van strikte handhygiëne!

HANDELING:



BESLISSINGSMOMENT:



VERPLEEGDOSSIER:



