

Opvolging zwangerschap HABO/AZ Sint-Lucas/AZ Sint-Jan

aantal weken	5w HA	9w HA	Rond 11-14w GYN	Rond 16w HA	Rond 20w GYN	Rond 24w HA tussendoor ev. GYN	29-33w GYN	≥32w HA/GYN om de 2-4w
Anamnese en info	Diagnose/beleving - zorgplan - actief risico's screenen - info prenatale diagnose	Beleving/klachten - zorgplan - actief risico's screenen - info prenatale diagnose	Beleving/klachten -info prenatale diagnose + IC	Beleving/klachten	Beleving/klachten - kindsbewegingen - signalen vroegtijdige ontsluiting en klachten pre-eclampsie	Beleving/klachten - kindsbewegingen - signalen vroegtijdige ontsluiting en klachten pre-eclampsie	Beleving/klachten - kindsbewegingen - signalen vroegtijdige ontsluiting en klachten pre-eclampsie Info prenatale oefeningen Info organisatie postpartale zorg	Beleving/klachten - kindsbewegingen - klachten pre-eclampsie Info borstvoeding Info bevalling Info organisatie postpartale zorg Info neonatale CMV screening + IC
KO	bloeddruk startgewicht BMI ¹	bloeddruk gewicht	bloeddruk gewicht harttonen	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte ligging
Labo	Hb, Hct, trombocyten, ferritine (Hb <11.5), bloedgroep/Rh, indirecte Coombs, nuchtere gly, toxo IgG+IgM (max 2x/zw), rubella IgG, hiv, TPHA en TPPA, HbsAg, anti HCV, CMV IgG+IgM (ntb), varicella?, parvo B19?, dipstick voor proteïnurie	dipstick voor proteïnurie	NIPT (Niet invasieve prenatale test) dipstick voor proteïnurie	CMV IgG + IgM bij seronegatieve pt (ntb) urinecultuur (asymptomatische bacteriurie) dipstick voor proteïnurie	dipstick voor proteïnurie	glucose (50g challenge test) ² ook HbA1C als afwijkende GCT en OGTT wordt gedaan (75g glucose – 3 waarden) Hb, Hct, Indirecte Coombs, toxo Ig G+IgM (max 2x/zw) dipstick voor proteïnurie	dipstick voor proteïnurie	dipstick voor proteïnurie GBS wisser tussen 35-37w (GYN)
TO			echo 1		echo 2		echo 3	
Voedings-supplement	foliumzuur	foliumzuur	foliumzuur					
AtiD-vacc	(griepvaccin)	(griepvaccin)	(griepvaccin)	griepvaccin (voorkeur 2 ^{de} trimester)	(griepvaccin)	Kinkhoestvaccin (griepvaccin)	zo nodig Rhogam (griepvaccin)	(griepvaccin)

¹ Meer info zie bron UZ Leuven

² Niet doen bij post-bariatrische heelkunde

ntb: niet terugbetaald, IC: informed consent